

## HOJA INFORMATIVA 2014

### DATOS ESTADÍSTICOS MUNDIALES

#### Personas que viven con el VIH

- En 2013, 35 millones [33,2 millones–37,2 millones] de personas vivían con el VIH.
  - Desde el comienzo de la epidemia, aproximadamente 78 millones [71 millones–87 millones] de personas contrajeron la infección por el VIH y 39 millones [35 millones–43 millones] de personas han fallecido a causa de enfermedades relacionadas con el VIH.

#### Nuevas infecciones por el VIH

- Los casos de nuevas infecciones por el VIH han descendido en un 38% desde 2001.
  - A nivel mundial, 2,1 millones [1,9 millones–2,4 millones] de personas contrajeron la infección por el VIH en 2013, en comparación con los 3,4 millones de casos registrados en 2001 [3,3 millones–3,6 millones].
- En los niños, las nuevas infecciones se han reducido en un 58% desde 2001.
  - A escala mundial, 240.000 [210.000–280.000] niños contrajeron la infección por el VIH en 2013, mientras que, en 2001, la cifra era de 580.000 [530.000–640.000].

#### Muertes relacionadas con el sida

- Desde el pico alcanzado en 2005, los casos de muerte relacionados con el sida se han reducido en un 35%.
  - En 2013, fallecieron 1,5 millones [1,4 millones–1,7 millones] de personas en todo el mundo por causas relacionadas con el sida, frente a los 2,4 millones [2,2 millones–2,6 millones] registrados en 2005.

#### Terapia antirretrovírica

- En junio de 2014, 13,6 millones de personas que vivían con el VIH tenían acceso a la terapia antirretrovírica.
  - En 2013, 12,9 millones (o un 37% [35%-39%]) de todas las personas que vivían con el VIH tenían acceso a dicha terapia.
  - Un 38% [36%-40%] de los adultos que viven con el VIH reciben actualmente el tratamiento que necesitan, mientras que tan solo un 24% [22%-26%] de los niños que viven con el VIH tienen acceso al mismo.

#### El VIH y la tuberculosis

- La cifra de muertes relacionadas con la tuberculosis en personas que viven con el VIH ha descendido en un 33% desde 2004.

- La tuberculosis continúa siendo la principal causa de muerte en las personas que viven con el VIH; se calcula que unas 360.000 personas [310.000–410.000] han fallecido en 2013 a causa de dicha enfermedad.
- En 2013, el porcentaje de pacientes seropositivos con tuberculosis que comenzaron o continuaron el tratamiento antirretrovírico fue del 70% (en comparación con el 60% registrado en 2012).

## Inversión

- Para acabar con la epidemia de sida para 2030, se necesitarán más recursos en los países de ingresos medios y bajos. Los países de ingresos bajos necesitarán 9.700 millones de dólares para 2020; los países de ingresos medios-bajos, 8.700 millones; y los países de ingresos medios-altos, 17.200 millones.
- Los países de ingresos medios-altos cubren la mayoría de las inversiones relacionadas con el VIH utilizando fuentes públicas nacionales (un 80% en 2013). Los países de ingresos medios-bajos y los de ingresos bajos utilizan un 22% y un 10% respectivamente.
- La necesidad de recursos a nivel mundial empezará a descender a partir de 2020. Para 2030, los recursos que se necesitan anualmente en todos los países de ingresos bajos y medios se reducirán hasta los 32.800 millones de dólares estadounidenses, un 8% menos de la cantidad que se requería en 2020. Gracias a estos recursos, se ofrecerá tratamiento antirretrovírico en 2020 al doble de personas que en 2015.

## DATOS ESTADÍSTICOS REGIONALES

### África subsahariana

- En 2013, **24,7 millones [23,5 millones – 26,1 millones]** de personas vivían con el VIH en África subsahariana.
  - Las mujeres representan el **58%** del total de personas que viven con el VIH en África subsahariana.
- En 2013, se produjeron aproximadamente **1,5 millones [1,3 millones – 1,6 millones]** de nuevas infecciones por el VIH en África subsahariana.
  - Las nuevas infecciones por el VIH descendieron un **33%** en el periodo de 2005 a 2013.
  - En la región de África subsahariana se concentra casi el **70%** del número total de nuevas infecciones por el VIH en todo el mundo.
- En 2013, **1,1 millones [1,0 millón – 1,3 millones]** de personas murieron por causas relacionadas con el sida en África subsahariana.
  - Entre 2005 y 2013, el número de muertes relacionadas con el sida descendió un **39%** en África subsahariana.
- La cobertura del tratamiento alcanza al **37%** de todas las personas que viven con el VIH en África subsahariana.

- En 2013, el **67%** de los hombres y el **57%** de las mujeres no recibían tratamiento antirretrovírico (TAR) en África subsahariana.
- **Tres de cada cuatro personas** que reciben TAR viven en África subsahariana.
- **En Nigeria, el 80%** de las personas no tiene acceso al tratamiento.
- En 2013, se produjeron **210.000 [180.000 – 250.000]** nuevas infecciones por el VIH en niños en África subsahariana.
  - Desde 2009, ha habido una disminución del **43%** de nuevas infecciones por VIH entre los niños de los **21 países prioritarios** del Plan Mundial en África.

### Asia y el Pacífico

- En 2013, **4,8 millones [4,1 millones – 5,5 millones]** de personas vivían con el VIH en Asia y el Pacífico.
- En 2013, se produjeron en la región aproximadamente **350.000 [250.000 – 510.000]** nuevas infecciones por el VIH.
  - Las nuevas infecciones por el VIH descendieron un **6%** en el periodo de 2005 a 2013.
  - Indonesia preocupa especialmente: desde **2005**, las nuevas infecciones por el VIH han aumentado un **48%**.
- En Asia y el Pacífico, **250.000 [210.000 – 290.000]** personas murieron por causas relacionadas con el sida en 2013.
  - Entre 2005 y 2013, el número de muertes relacionadas con el sida en la región experimentó un descenso del **27%**.
  - En India se contabiliza el **51%** de todas las muertes relacionadas con el sida en la región.
- La cobertura del tratamiento llega al **33% [28 – 38]** de las personas que viven con el VIH en Asia y el Pacífico.
- En 2013, cerca de **3,1 millones** de adultos no recibían TAR en Asia y el Pacífico.
  - Solo dos países de Asia y el Pacífico (Tailandia y Camboya) reúnen en la actualidad a más del 50 % de las personas que viven con el VIH y reciben tratamiento antirretrovírico.
- En 2013, se produjeron **22.000 [18.000 – 32.000]** nuevas infecciones por el VIH en niños en Asia y el Pacífico.
  - Desde 2009, se ha producido un descenso del **15%** del número de nuevas infecciones por el VIH en niños en la región.

### América Latina

- En 2013, **1,6 millones [1,4 millones – 2,4 millones]** de personas vivían con el VIH en América Latina.
- En 2013, se produjeron en la región aproximadamente **94.000 [71.000 – 170.000]** nuevas infecciones por el VIH.

- Las nuevas infecciones por el VIH descendieron un **3%** en el periodo de 2005 a 2013.
- En 2013, **47.000 [39.000 – 75.000]** personas murieron por causas relacionadas con el sida en América Latina.
  - Entre 2005 y 2013, el número de muertes relacionadas con el sida en la región experimentó un descenso del **31%**.
- La cobertura del tratamiento llega al **45% [33 – 51]** de las personas que viven con el VIH en América Latina.
- En 2013, se produjeron **1.800 [<1.000 – 7.400]** nuevas infecciones por el VIH en niños en América Latina.

#### **Europa central y occidental, y América del Norte**

- En 2013, **2,3 millones [2,0 millones – 3,0 millones]** de personas vivían con el VIH en Europa central y occidental, y América del Norte.
  - En Estados Unidos, se contabiliza el **56%** de las personas que viven con el VIH en esta parte del mundo.
- En 2013, se produjeron en la región aproximadamente **88.000 [44.000 – 160.000]** nuevas infecciones por el VIH.
- En Europa central y occidental, y América del Norte, **27.000 [23.000 – 34.000]** personas murieron por causas relacionadas con el sida en 2013.
  - Entre 2005 y 2013, el número de muertes relacionadas con el sida en la región experimentó un descenso del **2%**.
- La cobertura del tratamiento llega al **51% [39-60]** de las personas que viven con el VIH.
- En 2013, se produjeron **<500 [<200 – <500]** nuevas infecciones por el VIH en niños en Europa central y occidental, y América del Norte.

#### **Europa oriental y Asia central**

- En 2013, **1,1 millones [980.000 – 1,3 millones]** de personas vivían con el VIH en Europa oriental y Asia central.
- En 2013, se produjeron en la región aproximadamente **110.000 [86.000 – 130.000]** nuevas infecciones por el VIH.
  - El número de nuevas infecciones por el VIH ascendió un **5%** desde 2005 hasta 2013.
- En Europa oriental y Asia central, **53.000 [43.000 – 69.000]** personas murieron por causas relacionadas con el sida en 2013.
  - Entre 2005 y 2013, el número de muertes relacionadas con el sida en la región experimentó un aumento del **5%**.
- La cobertura del tratamiento llega al **21% [18-24]** de las personas que viven con el VIH en Europa oriental y Asia central.

- En 2013, se produjeron **<1.000 [**<1.000 – 1.200**]** nuevas infecciones por el VIH en niños en Europa oriental y Asia central.

### El Caribe

- En 2013, **250.000 [230.000 – 280.000]** personas vivían con el VIH en la región del Caribe.
- En 2013, se produjeron en la región cerca de **12.000 [9.400 – 14.000]** nuevas infecciones por el VIH.
  - Las nuevas infecciones por el VIH descendieron un **40%** en el periodo de 2005 a 2013.
- En 2013, **11.000 [8.300 – 14.000]** personas murieron por causas relacionadas con el sida en la región del Caribe.
  - Entre 2005 y 2013, el número de **muertes relacionadas con el sida en la región se redujo a la mitad.**
  - En Haití, se registró el **59%** del total de muertes relacionadas con el sida en la región en 2013.
- La cobertura del tratamiento alcanza al **42%** de las personas de 15 o más años de edad que viven con el VIH en la región del Caribe, lo que supone un **aumento del 31% desde 2011.**
- En 2013, se produjeron **<1.000 [**<500 – <1.000**]** nuevas infecciones por el VIH en niños en el Caribe.

### Oriente Medio y África septentrional

- En 2013, **230.000 [160.000 – 330.000]** personas vivían con el VIH en Oriente Medio y África septentrional.
- En 2013, se produjeron en la región aproximadamente **25.000 [14.000 – 41.000]** nuevas infecciones por el VIH.
  - Las nuevas infecciones por el VIH ascendieron un **7%** desde 2005 hasta 2013.
- En Oriente Medio y África septentrional, **15.000 [10.000 – 21.000]** personas murieron por causas relacionadas con el sida en 2013.
  - Entre 2005 y 2013, el número de muertes relacionadas con el sida en la región experimentó un aumento del **66%**.
- La cobertura del tratamiento llega al **11% [8 – 16]** de las personas que viven con el VIH en Oriente Medio y África septentrional.
- En 2013, tuvieron lugar **2.300 [1.500 – 3.400]** nuevas infecciones por el VIH en niños en Oriente Medio y África septentrional.

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013 (2014*)
<b>Personas que viven con el VIH</b>	<b>29,8 millones</b> [28,1-31,9 millones]	<b>30,7 millones</b> [29,0-32,7 millones]	<b>31,4 millones</b> [29,7-33,3 millones]	<b>31,8 millones</b> [30,2-33,7 millones]	<b>32,1 millones</b> [30,5-34,0 millones]	<b>32,4 millones</b> [30,8-34,3 millones]	<b>32,7 millones</b> [31,2-34,6 millones]	<b>33,1 millones</b> [31,5-34,9 millones]	<b>33,4 millones</b> [31,8-35,2 millones]	<b>33,8 millones</b> [32,2-35,6 millones]	<b>34,2 millones</b> [32,5-36,2 millones]	<b>34,6 millones</b> [32,8-36,6 millones]	<b>35,0 millones</b> [33,2-37,2 millones]
<b>Nuevas infecciones por el VIH (total)</b>	<b>3,4 millones</b> [3,3-3,6 millones]	<b>3,3 millones</b> [3,1-3,5 millones]	<b>3,1 millones</b> [3,0-3,3 millones]	<b>3,0 millones</b> [2,8-3,2 millones]	<b>2,9 millones</b> [2,7-3,1 millones]	<b>2,8 millones</b> [2,6-3,0 millones]	<b>2,7 millones</b> [2,5-2,9 millones]	<b>2,6 millones</b> [2,4-2,8 millones]	<b>2,5 millones</b> [2,3-2,7 millones]	<b>2,5 millones</b> [2,3-2,7 millones]	<b>2,4 millones</b> [2,2-2,6 millones]	<b>2,2 millones</b> [2,0-2,5 millones]	<b>2,1 millones</b> [1,9-2,4 millones]
<b>Nuevas infecciones por el VIH (adultos)</b>	<b>2,9 millones</b> [2,7-3,0 millones]	<b>2,7 millones</b> [2,5-2,9 millones]	<b>2,6 millones</b> [2,4-2,7 millones]	<b>2,4 millones</b> [2,3-2,6 millones]	<b>2,3 millones</b> [2,2-2,5 millones]	<b>2,2 millones</b> [2,1-2,4 millones]	<b>2,2 millones</b> [2,1-2,4 millones]	<b>2,2 millones</b> [2,0-2,3 millones]	<b>2,1 millones</b> [1,9-2,3 millones]	<b>2,1 millones</b> [1,9-2,3 millones]	<b>2,1 millones</b> [1,9-2,3 millones]	<b>2,0 millones</b> [1,8-2,2 millones]	<b>1,9 millones</b> [1,7-2,1 millones]
<b>Nuevas infecciones (niños)</b>	<b>580.000</b> [530.000 – 640.000]	<b>580.000</b> [540.000 – 640.000]	<b>580.000</b> [540.000 – 630.000]	<b>570.000</b> [520.000 – 620.000]	<b>550.000</b> [510.000 – 600.000]	<b>520.000</b> [480.000 – 580.000]	<b>490.000</b> [450.000 – 540.000]	<b>460.000</b> [420.000 – 510.000]	<b>400.000</b> [370.000 – 450.000]	<b>360.000</b> [330.000 – 400.000]	<b>330.000</b> [290.000 – 370.000]	<b>270.000</b> [240.000 – 310.000]	<b>240.000</b> [210.000 – 280.000]
<b>Muertes relacionadas con el SIDA</b>	<b>2,0 millones</b> [1,8-2,2 millones]	<b>2,1 millones</b> [2,0-2,4 millones]	<b>2,3 millones</b> [2,1-2,5 millones]	<b>2,4 millones</b> [2,2-2,6 millones]	<b>2,4 millones</b> [2,2-2,6 millones]	<b>2,3 millones</b> [2,1-2,5 millones]	<b>2,2 millones</b> [2,0-2,4 millones]	<b>2,1 millones</b> [1,9-2,3 millones]	<b>2,0 millones</b> [1,8-2,1 millones]	<b>1,9 millones</b> [1,8-2,1 millones]	<b>1,8 millones</b> [1,7–2,0 millones]	<b>1,7 millones</b> [1,5-1,8 millones]	<b>1,5 millones</b> [1,4-1,7 millones]
<b>Personas con acceso al tratamiento</b>									<b>5,2 millones</b>	<b>7,4 millones</b>	<b>9,0 millones</b>	<b>10,6 millones</b>	<b>12,9 millones/ *13.6 millones (junio)</b>
<b>Recursos (\$EE.UU)</b>		<b>3.800 millones</b>	<b>4.600 millones</b>	<b>5.700 millones</b>	<b>7.400 millones</b>	<b>8.800 millones</b>	<b>10.500 millones</b>	<b>14.600 millones</b>	<b>15.500 millones</b>	<b>15.600 millones</b>	<b>17.100 millones</b>	<b>18.900 millones</b>	<b>19.100 millones</b>

## Datos estadísticos regionales y mundiales de 2013 \*

Región	Personas que vivían con el VIH en 2013		Nuevas infecciones por el VIH en 2013		Muertes relacionadas con el SIDA en 2013 (total)
	total	niños	total	niños	
África subsahariana	<b>24.7 millones</b> [23,5 millones– 26,1 millones]	<b>2,9 millones</b> [2,6 millones– 3,2 millones]	<b>1,5 millones</b> [1,3 millones– 1,6 millones]	<b>210.000</b> [180.000– 250.000]	<b>1,1 millones</b> [1,0 millones– 1,3 millones]
Asia y el Pacífico	<b>4,8 millones</b> [4,1 millones– 5,5 millones]	<b>210.000</b> [190.000– 270.000]	<b>350 000</b> [250 000– 510 000]	<b>22 000</b> [18 000– 32 000]	<b>250 000</b> [210 000– 290 000]
América Latina	<b>1,6 millones</b> [1,4 millones– 2,1 millones]	<b>35.000</b> [27 000– 54 000]	<b>94.000</b> [71.000– 170.000]	<b>1.800</b> [<1.000– 7.400]	<b>47.000</b> [39.000– 75.000]
Europa Central y Occidental, y América del Norte	<b>2,3 millones</b> [2,0 millones– 3,0 millones]	<b>2.800</b> [2.300– 3.600]	<b>88.000</b> [44.000– 160.000]	<b>&lt;500</b> [<200– <500]	<b>27.000</b> [23.000– 34.000]
Europa Oriental y Asia Central	<b>1,1 millones</b> [980.000– 1,3 millones]	<b>14.000</b> [13.000– 14.000]	<b>110.000</b> [86.000– 130.000]	<b>&lt;1.000</b> [<1.000– 1.200]	<b>53.000</b> [43.000– 69.000]
El Caribe	<b>250.000</b> [230.000– 280.000]	<b>17.000</b> [14.000– 20.000]	<b>12.000</b> [9.400– 14.000]	<b>&lt;1.000</b> [<500– <1.000]	<b>11.000</b> [8.300– 14.000]
Oriente Medio y África septentrional	<b>230.000</b> [160.000– 330.000]	<b>16.000</b> [11.000– 22.000]	<b>25.000</b> [14.000– 41.000]	<b>2.300</b> [1.500– 3.400]	<b>15.000</b> [10.000– 21.000]
Mundial	<b>35 millones</b> [33,2 millones– 37,2 millones]	<b>3,2 millones</b> [2,9 millones– 3,5 millones]	<b>2,1 millones</b> [1,9 millones– 2,4 millones]	<b>240.000</b> [210.000– 280.000]	<b>1,5 millones</b> [1,4 millones– 1,7 millones]

\*Es posible que algunas cifras no sean exactas, ya que se han redondeado

### Contacto

Comunicaciones ONUSIDA | Tfl.: +41 22 791 1697 | [communications@unaid.org](mailto:communications@unaid.org)

### ONUSIDA

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) lidera e inspira al mundo para conseguir su visión compartida de cero nuevas infecciones por el VIH, cero discriminación y cero muertes relacionadas con el SIDA. El ONUSIDA reúne los esfuerzos de 11 organizaciones de las Naciones Unidas (ACNUR, UNICEF, PMA, PNUD, UNFPA, UNODC, ONU Mujeres, OIT, UNESCO, OMS y Banco Mundial) y trabaja en estrecha colaboración con asociados globales y nacionales para maximizar los resultados de la respuesta al sida. Acceda a más información en [unaid.org](http://unaid.org) y conecte con nosotros a través de Facebook y Twitter.